



Park-Apotheke



*Homöopathie *Naturheilmittel *Tierarzneimittel *Tees *Allopathie * Fernreiseimpfberatung * Intern. Kosmetik*

Park-Apotheke Iln. Helmut W. Jagla E.K. Apotheker für Offizin Pharmazie Amtsgericht Wuppertal HRA 15599 U.St.- Identifikationsnummer DE 12 11 44 796

Produktinformation nach Standardzulassung ZNR 2669.99.99

Oxalsäuredihydrat-Lösung 3,5% (m/V) ad us. vet.

Für Tiere: *Bienen*

Zusammensetzung

50,0 ml gebrauchsfertige Lösung enthalten

Wirkstoff: Oxalsäuredihydrat (HAB) 1,75 g.
Sonstige Bestandteile: Saccharose (PhEur) 30,015 g,
Wasser, gereinigt (PhEur) 30,015 g.

Darreichungsform und Inhalt

Oxalsäuredihydrat-/Saccharose-Lösung.

50 ml gebrauchsfertige Lösung (enthält Saccharose)

Stoff- oder Indikationsgruppe

Antiparasitikum

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Park-Apotheke Wuppertal Friedrich-Ebert-Str. 90, D42103 Wuppertal.

Anwendungsgebiete

Zur Behandlung der Varroose (*Varroa destructor*) der Honigbiene (*Apis mellifera*) in der brutfreien Zeit (Spätherbst).

Gegenanzeigen

Beim Einhalten der Dosierungsanleitung und der Art der Anwendung sind keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Oxalsäuredihydrat-Lösung darf nur einmalig während der brutfreien Zeit (Spätherbst) angewendet werden.

Es dürfen keine höheren Dosierungen oder mehrmalige Anwendungen vorgenommen werden!

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

Die Oxalsäuredihydrat-Lösung darf nicht eingenommen werden. Sie wirkt gesundheitsschädlich!

Bei versehentlichem Verschlucken viel Wasser trinken. Danach sofort einen Arzt aufsuchen.

Schwangere Frauen sollen nicht in Kontakt mit Oxalsäuredihydrat kommen.

Oxalsäuredihydrat-Lösung ist stark ätzend!

Jeder Hautkontakt mit Oxalsäuredihydrat-Lösung muss durch entsprechende Schutzkleidung vermieden werden!

Beim Arbeiten mit der Oxalsäuredihydrat-Lösung sind daher säurefeste Handschuhe und Schutzbrille zu tragen.

Das Tierarzneimittel darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.

Bei Kontakt mit den Augen müssen diese bei geöffnetem Lidspalt gründlich mit viel Wasser gespült werden. Es ist ein Arzt zu konsultieren.

Verschlucken auf die Haut des Anwenders gelangte Reste des Tierarzneimittels sind sofort mit viel Wasser und Seife zu entfernen.

Es sind die korrosiven Eigenschaften der Oxalsäuredihydrat-Lösung auf korrosionsempfindlichen Bauteilen und Imkergeräten zu beachten.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Mit calciumhaltigen Lösungen kann es zu Ausfällungen kommen.

Warnhinweise

Nicht anwenden während der Tracht.

Oxalsäuredihydrat darf nur einmalig während der brutfreien Zeit (Spätherbst) angewendet werden.

Dosieranleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die Lösung ist gebrauchsfertig und sollte handwarm angewandt werden.

Art und Dauer der Anwendung

Pro Volk werden je nach Volksstärke 30- 50 ml der gebrauchsfertigen Oxalsäuredihydrat-Lösung mit Hilfe eines Dosiergerätes (z.B. Automatikpipette, Einwegspritze) auf die bienenbesetzte Wabengassen geträufelt. Die Dosierung liegt bei 5- 6 ml pro Wabengasse, dies entspricht:

30 ml für ein kleines Volk,

40 ml für ein mittleres Volk,

50 ml für ein starkes Volk.

Der Milbenfall hält 3 Wochen an.

Die Behandlung mit Oxalsäuredihydrat-Lösung erfolgt im Spätherbst. Es darf keine Brut vorhanden sein.

Die Außentemperatur beim Träufeln sollte mindestens

3°C betragen.

Hinweise für den Fall der Überdosierung

Bei versehentlicher Applikation einer zu hohen Dosis kann versucht werden, mit Wasser nachzuträufeln. In Mitteleuropa wird die Behandlung mit Oxalsäuredihydrat-Lösung im Herbst in Konzentrationen bis zu 4,5% gut toleriert. Geringe Bienenverluste werden im Allgemeinen gegen Ende des Winters wieder aufgeholt. Die Anwendung einer höher dosierten Oxalsäuredihydrat-Lösung kann dagegen zu einer signifikant schlechteren Auswinterung der behandelten Völker führen. Bei Oxalsäuredihydrat-Lösung mit Konzentrationen von 5% und mehr wurde ein etwa verdoppelter Bienensterbenfall im Herbst, schlechtere Überwinterung und Frühjahrsentwicklung der Völker beschrieben. Wiederholte Behandlungen im Herbst oder die Anwendung im Sommer werden von Bienen auch in niedrigen Dosierungen toleriert.

Nebenwirkungen

Bisher sind, bei bestimmungsgemäßer Anwendung, keine Nebenwirkungen bekannt.

Falls Sie eine Nebenwirkung feststellen, welche nicht in dieser Produktinformation aufgeführt ist,

teilen Sie diese bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Wartezeit

Nach der Behandlung der Bienen mit Oxalsäuredihydrat-Lösung im Spätherbst darf Honig erst im darauf folgenden Frühjahr gewonnen werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Tierarzneimittel darf nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung von nicht verwendeten Arzneimitteln oder sonstige besondere Vorsichtsmaßnahmen, um Gefahren für die Umwelt zu vermeiden

Oxalsäuredihydrat darf nicht in die Umwelt gelangen. Ein Eindringen ins Erdreich, in Gewässer und in die Kanalisation ist zu verhindern!

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel müssen unter Beachtung der Sondermüllvorschriften einer Sondermüllentsorgung zugeführt werden.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Stand der Information

01.07.2014

APOTHEKENPFLICHTIG!



Tel: 0202-30 30 13
Fax: 0202-30 30 39
pille@park-apotheke.de
www.park-apotheke.de

Park-Apotheke
Apoth. Helmut W. Jagla e.K.
Friedrich-Ebert-Str. 88-90
42103 Wuppertal

Apo-Bank Wuppertal
BIC: DAAEDE1016
IBAN:
DE54300606010002251914



www.Park-Apotheke.de



Friedrich-Ebert-Str. 88/90
42103 Wuppertal



Spezialisiert auf:

- **Naturheilmittel für Tiere**
- **Homöopathie für Tiere**
- **Literatur für Tiere**

Bestellservice:

Tel: 0202-30 30 13

Fax: 0202-30 30 39

Mail: pille@park-apotheke.de

Ihre Apotheker

H.W. Jagla, T. Hogrebe, M. Burmester, Dr. C.A. Jagla